

## **ВАРИАНТЫ ПОДХОДОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ДЛЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Валитов Р.Г.

Омск, городской экологический центр

Переход к природопользованию, гарантирующему дальнейшее устойчивое функционирование биосферы, возможен лишь после реализации такого обустройства поверхности суши, при котором будут определены территории с основными функциональными экосистемами и их средоподдерживающими ландшафтами (обеспечивающими ионный сток и прочие условия), определены места и размеры территорий на которых возможна интенсивная хозяйственная деятельность и размещение мышленных и селитебных зон.

Основой пространственной организации природопользования является ландшафтно-землеустроительное проектирование размещения зон различного назначения и прежде всего - экологических каркасов.

Технологию проектирования экологических каркасов необходимо отработать на экспериментальных территориях - бассейнах водосборов малых рек. Они позволят решить вопросы по сохранению основных биосферных параметров, почвообразовательных процессов и кислородной продуктивности на территориях таких биосферных единиц как бассейны водосборов, определить локальные территории для интенсивной хозяйственной эксплуатации. Причем пространственное размещение экологических каркасов, их состав предопределен спецификой конкретных ландшафтных условий. Узловыми территориями для отработки данной технологии в электронном и обычном (карографическом) вариантах являются бассейны рек Тюкалка и Тарбуга. Выбор двух экспериментальных площадок связан с геоморфологическими особенностями левого и правого берегов рек. Бассейн реки Тюкалки с водосборной площадью 3200 кв. км - это более низкий левый берег Иртыша со слабо выраженной гидрологической сетью, а бассейн реки Тарбуга с водосборной площадью 3000 кв. км - это высокий правый берег Иртыша с четко выраженной гидрологической сетью.

Реализация такого проекта позволит развиваться концепции бассейнового природопользования, разработке методологической и методической базы проектирования экологических каркасов, методик по определению территорий для интенсивной хозяйственной деятельности, методик определения зональной и фактической кислородной продуктивности экосистем на ландшафтах бассейнов малых рек, разработке правовых, нормативных, экономических механизмов для внедрения биосферного природопользования на районных и областных административных территориях, на региональных и международных уровнях.

Основным назначением сетей экологических каркасов является:

1. Обеспечение благоприятных условий для сохранения микрофлоры и микрофауны почв.
2. Обеспечение резерваций для видового разнообразия флоры.
3. Обеспечение перемещение диких животных по коридорам охранных земель и лесополос.

4. Создание микробассейновой сети земель с различной степенью ограничения пользования для обеспечения стока грунтовых и поверхностных вод (ионного стока) в гидрологическую сеть через гидрогеологические коридоры (talwegи стока, овраги, балки, и пр.).

5. Обеспечение сохранности не менее чем на 40-60% территории бассейна водосбора растительного покрова в природном и антропогенном варианте, сохранности водоаккумулирующих форм рельефа.

Самыми сложными и трудоемкими моментами в технологии проектирования экологических каркасов является выявление действующих и деградированных коридоров стока поверхностных и грунтовых вод, зон подтопления грунтовыми водами, определения площади, занимаемой растительными сообществами в бассейне малой реки на настоящий момент времени. Для решения этих вопросов необходимо:

1. Использование имеющихся материалов фоновой аэро-, фото- и спутниковой информации или оформление заказа на проведение космической съемки в весенний (два снимка - по одному на каждый бассейн), летний (два снимка) и осенний сезон (два снимка) в полноспектральных диапазонах с пространственным разрешением 35x45 м (оформление таких заказов возможно в Московском инженерно-технологическом центре СканЭкс, дешифрирование съемочных материалов возможно через использование программы ScanViewer).

2. Проведение полевых исследований на местности способствует дешифровке материалов дистанционных съемок территорий бассейнов водосборов.

Спектральная весенняя и осенняя съемка по двум бассейнам позволит отработать методику выявления гидрологических коридоров стока грунтовых вод по аналогии выявления вечномерзлых почв по методике Якутского института мерзлотоведения.

Использование фоновых материалов служб, институтов, управлений и экспедиций и сравнение их с полевыми позволяет выявить общие закономерности функционирования и динамики развития экосистем бассейнов. Выявление закономерностей ионного стока, направленности стока грунтовых вод в выбранных для эксперимента бассейнах водосборов способствуют данные материалов фондов гидрологической партии, управления гидрометеорологии, Центра мониторинга за загрязнением природной среды, комитета природных ресурсов по Омской области и полевые исследования гидрологической ситуации на местности. Материалы библиотек областных краеведческих музеев, работы ученых историков-краеведов позволяют выявить исторические границы бассейнов водосборов, динамику изменения в природных экосистемах за исторический период. Материалы отделения лесоустройской экспедиции и отделения Всероссийского института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий, кафедр землеустройства, аэрофотогеодезии, почвоведения аграрных университетов, кафедры географии государственного педагогического университета дают возможность получить данные по топографии, по лесным ресурсам, сельхозугодьям и землепользователям, выявить закономерности почвообразовательных процессов в обследуемых бассейнах рек.

Для отработки методов определения кислородной продуктивности экосистем бассейнов водосборов по материалам летней космической съемки в полноспектральном диапазоне с пространственным разрешением 35x45 необходимо сравнение данных этих материалов с материалами полевых исследований по определению площадей покрытия растительным покровом, его ярусности. Для чего заказывается проведение летних космических съемок и проводятся работы в бассейнах рек по их дешифровке. В дальнейшем необходимо применение ряда методов дистанционного измерения первичной биопродуктивности. В основу зональной продуктивности экосистем необходимо взять показатели из материалов Международной биологической программы (IBP) и результатов исследований программы "Человек и биосфера" (МАВ, 1968).

Основой новых принципов землестроительного обустройства территории должно стать прежде всего проектирование экологического каркаса на всех ландшафтных комплексах, являющихся подразделениями биосферных единиц суши. Лишь таким образом можно обеспечить длительное сохранение основных функциональных экосистем. Но их сохранение невозможно без включения вместе с ними в единый комплекс водоохраных зон и прибрежных полос водоёмов, гидрологических коридоров стока поверхностных и грунтовых вод, обеспечивающих нормальное протекание обменных процессов биосферных единиц суши.